

Rikkakasvien torjunta-aineiden vaikutustavat

Valmiste	Tehoaine	Vaikutus-tapa ¹⁾		Sateen-kesto ²⁾	Jälkikasvirajoitukset ³⁾		Varoaika, vrk
		Lehti	Maa		Arat	Kestävähköt, kestävät	
Leveälehtisten rikkakasvien torjunta-aineet							
Basagran SG Maatilan Bentatsoni 3	bentatsoni	XXX	X	huono	ristikukkaiset, juurikkaat	viljat, heinät, palkokasvit, pellava	
Basagran M 75	bentatsoni + MCPA	XXX	X	huono	ristikukkaiset, juurikkaat	viljat, heinät, palkokasvit, pellava	
Fenix Maatilan Aklonifeeni Maatilan Aklonifeeni 2	aklonifeeni ⁴⁾	XX	XXX	hyvä	ristikukkaiset	peruna, herne, sarjakukkaiset, sipuli, auringonkukka	70
Metro Mistral Maatilan Metributsiini	metributsiini	XX	XXX	hyvä	viljat, heinät, ristikukkaiset	peruna, härkäpapu	
Stomp	pendimetaaliini ⁵⁾	X	XXX	hyvä		sarjakukkaiset, sipulit, maissi, pavut	
Hedonal-MCPA	MCPA	XXX	-	keskinkertainen		viljat, heinät, apila, pellava	
Heinämaisten rikkakasvien torjunta-aineet							
Targa Super 5 SC Pilot Ultra	kvitsalofoppi-P-etyyli ⁶⁾	XXX	-	hyvä		kaikki leveälehtiset viljelykasvit	35/45
Agil 100 EC Maatilan Propafop	propakvitsafoppi	XXX	-	hyvä		kaikki leveälehtiset viljelykasvit	45
Focus Ultra Laser Ultra Stratos Ultra	sykloksidiimi ⁷⁾	XXX	-	hyvä		kaikki leveälehtiset viljelykasvit	55
Aramo	tepraloksidiimi ⁸⁾	XXX	-	hyvä		kaikki leveälehtiset viljelykasvit	35
Select Plus	kletodiimi	XXX	-	hyvä		kaikki leveälehtiset viljelykasvit	56

¹⁾ Vaikutus lehtien/maan kautta: xxx = tehoaa erinomaisesti, - ei tehoa lainkaan

²⁾ Sateen kestävyys ”hyvä” saavutetaan alle kahdessa tunnissa, ”keskinkertainen” 2-4 tunnissa, ”huono” yli neljän tunnin kuluttua

³⁾ Tarkemmat tiedot myyntipäällystekstissä tai kasvin suojeleuainerekisterissä www.tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri

⁴⁾ Varoaika 70 vrk, ei voi käyttää pakaste- ja tuoreherneellä

⁵⁾ Minor use -hyväksyntä

⁶⁾ Varoajat: pakasteherne 35 vrk, ruokaherne (kuiva) 45 vrk

⁷⁾ Ei saa käyttää palkoineen korjattavalla herneellä

⁸⁾ Poistuu rekisteristä 30.11.2016, minkä jälkeen käyttö ei ole sallittua